DOI:10.3724/SP.J.1008.2011.00233

· 论 著 ·

IL-22 抑制 ox-LDL 诱导的 CRL-1730 细胞凋亡并上调其 Bcl-2 表达

孙 懿, 胡志德, 黄元兰, 熊怡淞, 邓安梅*, 仲人前*

第二军医大学长征医院实验诊断科, 全军医学免疫诊断中心, 全军临床免疫重点实验室, 上海 200003

[摘要] **目的** 研究 IL-22 对 ox-LDL 诱导的 CRL-1730 细胞(人脐静脉内皮细胞)凋亡的影响及其机制。**方法** 100 $\mu\text{g/ml}$ ox-LDL 刺激 CRL-1730 细胞, 不同时间点经实时荧光定量 RT-PCR 检测 CRL-1730 细胞中 IL-22 受体 R1(IL-22R1) mRNA 的表达状况。然后在 ox-LDL 诱导的 CRL-1730 细胞凋亡模型中加入 20 ng/ml 外源性 IL-22, 通过 Annexin V-PI 凋亡试剂盒检测其对细胞凋亡的影响, 经实时荧光定量反转录 PCR 检测 Bcl-2、Bcl-xl、Bcl-w、caspase 3 及 STAT3 mRNA 的表达, 采用免疫印迹法分析 STAT3 磷酸化和 Bcl-2 蛋白的水平。**结果** IL-22R1 mRNA 在 ox-LDL 刺激后表达明显增高($P < 0.05$), 且于 12 h 达峰值($P < 0.01$); 加入 IL-22 可明显抑制 ox-LDL 刺激诱导的内皮细胞凋亡($P < 0.01$), 促进抗凋亡基因 Bcl-2、Bcl-xl 和 Bcl-w 表达, 而降低 caspase 3 mRNA 表达($P < 0.01$)。此外, IL-22 作用 1~2 h STAT3 发生磷酸化, 4 h 后 Bcl-2 蛋白表达升高($P < 0.01$)。**结论** IL-22 可抑制 ox-LDL 诱导的 CRL-1730 细胞凋亡, 这可能与促使 STAT3 磷酸化, 上调抗凋亡分子 Bcl-2、Bcl-xl 和 Bcl-w 的表达, 抑制促凋亡分子 caspase 3 的表达有关。

[关键词] 白细胞介素; 人脐静脉内皮细胞; 氧化 LDL; 细胞凋亡; Bcl-2 基因; STAT3 蛋白

[中图分类号] R 541.4 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 0258-879X(2011)03-0233-05

IL-22 inhibits ox-LDL-induced apoptosis and increases Bcl-2 expression in CRL-1730 cells

SUN Yi, HU Zhi-de, HUANG Yuan-lan, XIONG Yi-song, DENG An-mei*, ZHONG Ren-qian*

Department of Laboratory Medicine, Changzheng Hospital, Second Military Medical University, Clinical Immunology Center of PLA, Key Lab of PLA Clinical Immunology, Shanghai 200003, China

[Abstract] **Objective** To investigate the effect of interleukin-22 (IL-22) on apoptosis of CRL-1730 cells(human umbilical vein endothelial cell line) induced by ox-LDL and the possible mechanism. **Methods** Expression of IL-22 receptor R1 (IL-22R1) mRNA in CRL-1730 cells stimulated with ox-LDL (100 $\mu\text{g/ml}$) was detected by fluorescence quantitative RT-PCR. Flow cytometry was applied to examine the effect of exogenous IL-22 (20 ng/ml) on the ox-LDL-induced apoptosis of CRL-1730 cells. The expression of Bcl-2, Bcl-xl, Bcl-w, caspase 3, and STAT3 mRNA in CRL-1730 cells treated or untreated with IL-22 and ox-LDL were measured by fluorescence quantitative RT-PCR; the phosphorylation status of STAT3 and the Bcl-2 protein level were examined by Western blotting analysis. **Results** The expression of IL-22R1 mRNA increased in a time-dependent manner ($P < 0.05$) and peaked at 12 h after ox-LDL stimulation. Treatment with IL-22 significantly inhibited the apoptosis of CRL-1730 cells induced by ox-LDL($P < 0.01$), increased the expression of anti-apoptosis genes Bcl-2, Bcl-xl, and Bcl-w, and decreased expression of caspase 3 mRNA($P < 0.01$). STAT3 phosphorylation occurred 1-2 h after IL-22 treatment and Bcl-2 protein expression increased 4 h after IL-22 treatment in ox-LDL stimulated CRL-1730 cells. **Conclusion** IL-22 can inhibit the pro-apoptosis effect of ox-LDL in the CRL-1730 cells, which might be associated with the increased expression of Bcl-2, Bcl-xl, and Bcl-w mRNA, decreased expression of caspase 3, and induced STAT3 phosphorylation.

[Key words] interleukin-22; human umbilical vein endothelial cell; oxidized-LDL; apoptosis; Bcl-2 genes; STAT 3 protein

[Acad J Sec Mil Med Univ, 2011, 32(3):233-237]

随着全球人口日趋老龄化, 心脑血管疾病已成为一类严重危害人类健康的疾病, 发病率和病死率

居高不下^[1]。而作为这些严重疾病的起始病变的动脉粥样硬化(AS)是一种复杂的多因素疾病, 发病机

[收稿日期] 2010-12-31 **[接受日期]** 2011-01-20

[基金项目] 国家自然科学基金(30770997, 30972730, 81072479), 上海市科委基金(09JC1405400, 08QH14001). Supported by National Natural Science Foundation of China (30770997, 30972730, 81072479) and Project of Science and Technology Committee of Shanghai Municipality (09JC1405400, 08QH14001).

[作者简介] 孙 懿, 硕士生. E-mail: medsunyi@yahoo.com.cn

* 通信作者(Corresponding authors). Tel: 021-81886074, E-mail: amdeng70@yahoo.com; Tel: 021-81886071, E-mail: rqzhong@yahoo.com

制尚不明确。内皮细胞作为血管壁的屏障,在病变早期与血液中的多种危险因素直接接触。大量研究表明,内皮细胞功能损伤与凋亡和 AS 斑块形成密切相关^[2]。其中氧化型低密度脂蛋白(ox-LDL)是导致内皮功能损伤引起细胞凋亡的关键危险因素之一^[3]。在内皮细胞凋亡事件中,ox-LDL 刺激使抑制凋亡蛋白 Bcl-2 家族表达下调,导致 Caspases 活化,启动细胞程序性死亡是凋亡的重要原因之一^[3-4]。

IL-22 是 Renauld 小组于 2000 年发现的一种免疫介质^[5],由活化的 Th17 细胞、NK 细胞、CD11c⁺骨髓细胞和淋巴样组织诱导细胞等分泌产生^[6]。IL-22 受体由 IL-22R1 和 IL-10R2 组成,其中,IL-10R2 广泛表达于人体除免疫细胞外的多种组织细胞^[6]。IL-22R1 特异性表达于非造血源性组织,如皮肤、肝脏、胃、小肠以及肺等,参与 IL-22 介导的局部炎症反应^[7]。多项研究表明,在多种免疫炎症疾病中,IL-22 具有促进组织修复再生、抑制细胞凋亡等多种生物学功能^[8-12]。Sonnenberg 等^[11]在用高剂量博莱霉素诱导的急性气道炎症小鼠实验中发现 IL-22 可剂量依赖性地改善博莱霉素诱导的呼吸道上皮细胞凋亡。此外,研究发现 IL-22 在肝细胞和人肺癌细胞中也具有抗凋亡作用^[10-12]。有研究认为内皮细胞是 IL-22 的作用靶点之一^[9]。

基于这些事实,我们推测,IL-22 可能通过抑制内皮细胞凋亡的方式参与 AS 的发病。故本研究通过体外培养人脐静脉内皮细胞株 CRL-1730,利用 ox-LDL 诱导内皮细胞凋亡模型,观察 IL-22 对 ox-LDL 诱导的 CRL-1730 细胞凋亡的影响。此外,通过检测细胞内 Bcl-2 蛋白家族表达的变化,分析 IL-22 影响 ox-LDL 诱导的血管内皮细胞凋亡的可能机制。

1 材料和方法

1.1 主要仪器及试剂

M199 液体培养基购自 Hy-colon 公司,胎牛血清购自 Gibco 公司,ox-LDL 购自 Yuanyuan Biotech 公司;人重组 IL-22、VEGF、FGF-B 蛋白购自 PeproTech 公司;Annexin V-PI 凋亡试剂盒购自 BD Biosciences 公司;TRIzol 试剂及反转录试剂盒购自 Invitrogen 公司,SYBR Green Real-time PCR 试剂盒购自 Toyobo 公司;核酸蛋白定量检测仪为 Eppendorf 公司产品;ABI 公司 7000 Real-time PCR 仪;抗磷酸化 STAT3 抗体购自 Abcam 公司,抗人 Bcl-2 单克隆抗体购自 eBioscience

公司,抗 STAT3 抗体和 actin 购自 Biolegend 公司,HRP 结合的兔抗鼠二抗和羊抗兔二抗均购自 Sigma 公司。

1.2 细胞的培养与刺激

CRL-1730 购于 ATCC (美国组织培养库)。CRL-1730 细胞用含 10% 胎牛血清,100 U/ml 青霉素,100 μg/ml 链霉素,10 ng/ml VEGF,5 ng/ml FGF-B 的 M199 培养液,在 37℃、5% CO₂、饱和湿度条件下培养。每 2~3 d 换培养基 1 次,选择处于对数生长期的细胞进行实验。在 24 孔板中植入 CRL-1730 细胞(0.5×10⁶个/孔),培养 24 h 后,每孔加入终浓度为 100 μg/ml 的 ox-LDL,分别于刺激 0、6、12、24、48 h 后收集细胞,用于 PCR 检测细胞 IL-22R1 mRNA 的表达。12 孔板中置入 CRL-1730 细胞(1×10⁶个/孔),培养 24 h 后,分为 3 组处理,ox-LDL 组:加入 100 μg/ml ox-LDL;IL-22+ox-LDL 组:同时加入 100 μg/ml ox-LDL 和 20 ng/ml IL-22;空白对照组:加入等量 PBS。培养 24 h 后收集细胞,使用 Annexin V-PI 凋亡试剂盒检测凋亡,PCR 检测 Bcl-2、Bcl-w、Bcl-xl、caspase 3 和 STAT3 mRNA 表达情况。向 12 孔板内同时加入 100 μg/ml ox-LDL,分别收集加或不加 20 ng/ml IL-22 作用 0、1、2、4 h 的细胞,免疫印迹法检测 Bcl-2、STAT3 蛋白及 STAT3 磷酸化情况。每组实验至少重复 3 次。

1.3 荧光定量 RT-PCR 检测细胞 IL-22RA 及 Bcl-2 mRNA 表达

使用 TRIzol 抽提处理后收集细胞的总 RNA,分别通过 1.2% 琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度仪,检测提取的总 RNA 的质量和浓度。严格按反转录试剂盒推荐步骤操作,将总 RNA 反转录为 cDNA。根据基因库中目的基因的 mRNA 序列,用 Primer Express 软件设计基因的特异性引物,IL-22R1 引物序列:上游 5'-CCA GCG AGT CCT GAC TTT CC -3',下游 5'-TAG GTG ATC TCG GAC AGG CTA -3';Bcl-2 引物序列:上游 5'-GGG GAG GAT TGT GGC CTT C-3',下游 5'-CAG GGC GAT GTT GTC CAC C-3';Bcl-w 引物序列:上游 5'-CAC CCA GGT CTC CGA TGA AC -3',下游 5'-TTG TTG ACA CTC TCA GCA CAC-3';Bcl-xl 引物序列:上游 5'-GAG CTG GTG GTT GAC TTT CTC-3',下游 5'-GGG GCC TCA GTC CTG TTC T-3';caspase 3 引物序列:上游 5'-ATG GAA GCG AAT CAA TGG ACT C-3',下游 5'-CTG TAC CAG ACC GAG ATG TCA-3';STAT3 引物序列:

上游 5'-CAG CAG CTT GAC ACA CGG TA-3', 下游 5'-GCC CAA TCT TGA CTC TCA ATC C-3'; GAPDH 引物序列: 上游 5'-ATG GGG AAG GTG AAG GTC G-3', 下游 5'-GGG GTC ATT GAT GGC AAC AAT A-3'。引物委托上海生工生物工程技术服务有限公司合成。以反转录的 cDNA 为模板, 使用 SYBR Green Real-time PCR 试剂盒进行荧光定量 PCR, 每个样本设 3 个复孔。荧光定量 PCR 扩增变量为: 94℃ 10 min, 然后 94℃ 30 s, 56℃ 15 s, 72℃ 1 min 循环 40 次, 72℃ 10 min。作溶解曲线验证扩增产物的特异性, 反应完成后设定基线值 (baseline) 和阈值 (threshold), 读取阈循环 (Ct) 值。根据公式 $\Delta Ct = [Ct(\text{目的基因})] - [Ct(\text{内参基因})]$ 和 $\Delta\Delta Ct = [\Delta Ct(\text{研究组})] - [\Delta Ct(\text{对照组})]$, 计算出相对表达量 = $2^{-\Delta\Delta Ct}$ [13]。

1.4 Annexin V-PI 凋亡试剂盒 收集处理后细胞, PBS 洗涤 2 遍, 取 1×10^6 细胞重悬于 100 μ l HEPES 溶液中, 加入 10 μ l FITC-Annexin V, 避光 4℃ 孵育 30 min, 然后加入 5 μ l PI, 10 min 内上机检测。流式细胞图将凋亡细胞分 4 个细胞亚群: 左下象限 (Annexin⁻/PI⁻) 代表活细胞; 左上象限 (Annexin⁻/PI⁺) 代表坏死细胞; 右下象限 (Annexin⁺/PI⁻) 代表早期凋亡细胞; 右上象限 (Annexin⁺/PI⁺) 代表中晚期凋亡细胞。

1.5 蛋白质印迹法检测 Bcl-2、STAT3 等蛋白表达 收集处理后的 CRL-1730 细胞, PBS 缓冲液洗涤细胞 2 遍, 冰上加入 1% Triton lysis 细胞裂解液 (含 PMSF、NaVO₄、NaF 和蛋白酶抑制剂), 再加入 5× 上样缓冲液 (含二巯基乙醇), 100℃ 热浴 5 min, 离心取上清。蛋白质定量后, 取 60 μ g 蛋白上样至 12% SDS-PAGE 胶上进行电泳, 电泳分离后将蛋白转至硝酸纤维膜上。5% BSA 封闭硝酸纤维膜 37℃ 1 h, 加入特异性抗体 4℃ 过夜或 37℃ 孵育 2 h。回收一抗, 加入 TBST 置于摇床上洗涤 5 次后, 加入辣根过氧化酶结合的二抗, 室温避光, 摇床上孵育 1 h。回收二抗, TBST 洗涤 5 次后, ECL 法显影。通过 Scion Image 软件检测, 目的蛋白条带相对密度值 = 目的蛋白条带密度均值 / 相应 actin 条带密度均值。

1.6 统计学处理 所有数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示, 应用 SPSS 13.0 软件进行统计学处理, 采用独立样本 *t* 检验进行两组计量数据间比较, 单因素方差分析比较多组数据的组间差异。检验水平 (α) 为 0.05。

2 结果

2.1 ox-LDL 对 HUVEC 细胞 IL-22R1 mRNA 表达的影响 与对照组比较, ox-LDL 处理 CRL-1730 细胞后 IL-22R1 mRNA 的相对表达量增高, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 且其表达于 12 h 后达高峰, 与对照组比较上升约 3 倍 (2.83 ± 0.29 vs 0.99 ± 0.23 , $P < 0.01$, 图 1)。

图 1 ox-LDL 刺激后 CRL-1730 细胞 IL-22R1 mRNA 相对表达量

Fig 1 Expression of IL-22R1 mRNA in ox-LDL stimulated CRL-1730 cells

* $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ vs control group at the same time point; $n=3$, $\bar{x} \pm s$

2.2 IL-22 抑制 ox-LDL 诱导的 CRL-1730 细胞凋亡 结果见图 2, 在 ox-LDL 诱导下 CRL-1730 细胞凋亡和死亡细胞比例较空白组明显增加 ($P < 0.05$); 与 ox-LDL 组 CRL-1730 细胞早期凋亡 (Annexin⁺/PI⁻) 比较, IL-22 + ox-LDL 组早期凋亡细胞比例明显减少 ($0.68\% \pm 0.12\%$ vs $3.16\% \pm 0.27\%$, $P < 0.01$), 中晚期凋亡细胞 (Annexin⁺/PI⁺) 比例亦显著减少 ($2.51\% \pm 2.17\%$ vs $8.47\% \pm 3.03\%$, $P < 0.01$)。这些结果表明: IL-22 具有抑制 ox-LDL 诱导的 CRL-1730 细胞凋亡的作用。

2.3 IL-22 对 ox-LDL 处理的 CRL-1730 细胞 Bcl-2、Bcl-w、Bcl-xl、caspase 3 和 STAT3 mRNA 表达的影响 如图 3 所示, 经 ox-LDL 处理后, CRL-1730 细胞内凋亡抑制基因 Bcl-2 和 Bcl-xl mRNA 表达明显下降 ($P < 0.01$), 而 caspase 3 和 STAT3 mRNA 的表达明显上升 ($P < 0.01$); 与 ox-LDL 组比较, IL-22 + ox-LDL 组 Bcl-2 (0.95 ± 0.08 vs 0.28 ± 0.08), Bcl-xl (1.09 ± 0.17 vs 0.12 ± 0.02), Bcl-w (10.28 ± 0.63 vs 0.91 ± 0.08) 和 STAT3 (6.83 ± 0.49 vs 2.3 ± 0.36) mRNA 相对表达量上升 ($P < 0.01$), 而 caspase 3 (1.26 ± 0.13 vs 3.86 ± 0.36) mRNA 表达下降 ($P < 0.01$)。

图 2 IL-22 对 ox-LDL 处理的 CRL-1730 细胞凋亡的影响
Fig 2 Effect of IL-22 on ox-LDL-induced CRL-1730 cell apoptosis

A: Apoptosis status of ox-LDL-treated CRL-1730 cells with or without IL-22. B: The data in Fig 2A was summarized. 1: Annexin⁺/PI⁻; 2: Annexin⁺/PI⁺; 3: Annexin⁻/PI⁺. ** $P < 0.01$ vs ox-LDL group; $n = 3, \bar{x} \pm s$

图 3 IL-22 对 ox-LDL 处理的 CRL-1730 细胞凋亡相关基因的表达影响

Fig 3 Effect of IL-22 on expression of apoptosis related genes in ox-LDL stimulated CRL-1730 cells

** $P < 0.01$ vs ox-LDL group; $n = 3, \bar{x} \pm s$

3 讨论

大量研究证实,内皮细胞功能损伤及凋亡与动脉粥样斑块形成密切相关^[2]。ox-LDL 是导致内皮功能损伤引起细胞凋亡的关键危险因素之一。故本研究通过体外培养人脐静脉内皮细胞株 CRL-1730,利用 ox-LDL 诱导内皮细胞凋亡模型,观察 IL-22 在内皮细胞凋亡过程中发挥的作用及可能机制,初步探讨 IL-22 在血管内皮及动脉粥样硬化发病过程中的作用。我们的实验结果证实:IL-22 可以抑制 ox-LDL 诱导的 CRL-1730 细胞凋亡,提示其可能参与 AS 的内皮损伤修复过程。

本研究首先发现,IL-22R1 mRNA 在 ox-LDL 刺激后表达明显增高($P < 0.05$),且于 12 h 后达峰值。此部分数据初步表明了 CRL-1730 存在 IL-22 受体,为 IL-22 发挥作用奠定了物质基础。随后,我们通过 Annexin V-PI 凋亡试剂盒检测证实了 ox-LDL 刺激内皮细胞后导致细胞大量凋亡,并发现 IL-22 可以显著抑制 ox-LDL 诱导的 CRL-1730 细胞的早期和晚期凋亡。

在细胞凋亡事件中,Bcl-2 家族是重要的凋亡调节器^[14]。Bcl-2 蛋白、BH3-only 蛋白和 Bax 蛋白相互制约,它们三者的平衡决定了 caspase 依赖的程序性死亡途径的激活与否,其中 Bcl-2 蛋白是关键性的凋亡抑制蛋白^[14]。Bcl-2、Bcl-xl 和 Bcl-w 是 Bcl-2 蛋白家族的主要成员。Chen^[4]研究发现,ox-LDL 可通过与内皮细胞表面受体 LOX-1 作用,降低 Bcl-2 和抑制凋亡蛋白(c-IAP-1)等抗凋亡蛋白表达,引起线粒体源性的细胞色素 C 释放,触发 caspase 级联反应,从而引起内皮细胞凋亡。这是其引起动脉粥样硬化的重要机制之一。故我们推测 Bcl-2 家族可能参与 IL-22 调控 CRL-1730 细胞凋亡的过程。

2.4 免疫印迹法检测 Bcl-2、STAT3 蛋白及 STAT3 磷酸化情况 与 ox-LDL 刺激组比较,在 IL-22 作用后 4 h Bcl-2 蛋白表达增高(0.72 ± 0.04 vs $0.38 \pm 0.02, P < 0.01$),IL-22 刺激后 1、2 h STAT3 磷酸化水平升高(0.73 ± 0.03 vs $0.13 \pm 0.01, 0.72 \pm 0.07$ vs $0.12 \pm 0.01, P < 0.01$)。详见图 4。结果表明 IL-22 刺激 CRL-1730 细胞可能通过 STAT3 信号通路诱导 Bcl-2 蛋白表达。

图 4 IL-22 对 ox-LDL 处理的 CRL-1730 细胞的 STAT3 磷酸化和 Bcl-2 蛋白表达的影响

Fig 4 Effect of IL-22 on phosphorylation of STAT3 and expression of Bcl-2 protein in ox-LDL stimulated CRL-1730 cells

通过 RT-PCR 检测我们证实了先前的研究^[4], 在 ox-LDL 诱导的 CRL-1730 凋亡模型中, Bcl-2 家族抗凋亡分子 Bcl-2、Bcl-xl 及 Bcl-w mRNA 表达显著下调, 而程序性死亡蛋白水解酶 caspase 3 mRNA 表达明显上升。更重要的是我们发现 IL-22 可促进抗凋亡基因 Bcl-2、Bcl-xl 和 Bcl-w 的表达 ($P < 0.01$), 同时抑制 caspase 3 表达 ($P < 0.01$)。这些结果提示 IL-22 可能通过上调 Bcl-2 蛋白家族 Bcl-2、Bcl-xl 及 Bcl-w 表达调控血管内皮细胞受损后的凋亡。

有研究报道 IL-22 刺激可能通过 STAT3 信号通路发挥作用^[15], 而 Bcl-2 启动子区域有许多 STAT3 结合位点^[16]。因此, 我们推测 IL-22 可能通过 STAT3 信号通路上调受损内皮细胞中 Bcl-2 蛋白的表达。通过 RT-PCR 和蛋白印迹实验我们发现 IL-22 刺激受损内皮细胞后 STAT3 mRNA 表达明显上调 ($P < 0.05$), IL-22 作用后 1~2 h 可见 STAT3 磷酸化水平增高, 作用 4 h 后可见 Bcl-2 蛋白表达增加。

总之, 本研究初步发现 IL-22 具有抑制 ox-LDL 诱导的 CRL-1730 细胞凋亡的作用, 该生物学作用可能与其通过 STAT3 信号通路直接或间接促进 CRL-1730 细胞中抗凋亡蛋白 Bcl-2 家族 Bcl-2、Bcl-xl 和 Bcl-w 的表达, 抑制促凋亡分子 caspase 3 的表达, 从而减少 ox-LDL 所致的内皮凋亡有关。本研究结果提示, IL-22 可能是 AS 潜在的治疗靶点。

[参考文献]

- [1] Lusis A J. Atherosclerosis[J]. Nature, 2000, 407: 233-241.
- [2] Sima A V, Stancu C S, Simionescu M. Vascular endothelium in atherosclerosis[J]. Cell Tissue Res, 2009, 335: 191-203.
- [3] Li D, Yang B, Mehta J L. Ox-LDL induces apoptosis in human coronary artery endothelial cells: role of PKC, PTK, bcl-2, and Fas[J]. Am J Physiol, 1998, 275(2 Pt 2): H568-H576.
- [4] Chen J. Role of caspases in ox-LDL-induced apoptotic cascade in human coronary artery endothelial cells[J]. Circ Res, 2004, 94: 370-376.
- [5] Dumoutier L, Louahed J, Renaud J C. Cloning and characterization of IL-10-related T cell-derived inducible factor (IL-TIF), a novel cytokine structurally related to IL-10 and inducible by IL-9[J]. J Immunol, 2000, 164: 1814-1819.
- [6] Colonna M. Interleukin-22-producing natural killer cells and lymphoid tissue inducer-like cells in mucosal immunity[J]. Immunity, 2009, 31: 15-23.
- [7] Wolk K, Kunz S, Witte E, Friedrich M, Asadullah K, Sabat R. IL-22 increases the innate immunity of tissues[J]. Immunity, 2004, 21: 241-254.
- [8] Boniface K, Bernard F X, Garcia M, Gurney A L, Lecron J C, Morel F. IL-22 inhibits epidermal differentiation and induces proinflammatory gene expression and migration of human keratinocytes[J]. J Immunol, 2005, 174: 3695-3702.
- [9] Chang H, Hanawa H, Liu H, Yoshida T, Hayashi M, Watanabe R, et al. Hydrodynamic-based delivery of an interleukin-22-Ig fusion gene ameliorates experimental autoimmune myocarditis in rats[J]. J Immunol, 2006, 177: 3635-3643.
- [10] Ki S H, Park O, Zheng M, Morales-Ibanez O, Kolls J K, Bataller R, et al. Interleukin-22 treatment ameliorates alcoholic liver injury in a murine model of chronic-binge ethanol feeding: Role of signal transducer and activator of transcription 3[J]. Hepatology, 2010, 52: 1291-1300.
- [11] Sonnenberg G F, Nair M G, Kirn T J, Zaph C, Fouser L A, Artis D. Pathological versus protective functions of IL-22 in airway inflammation are regulated by IL-17A[J]. J Exp Med, 2010, 207: 1293-1305.
- [12] Zhang W, Chen Y, Wei H, Zheng C, Sun R, Zhang J, et al. Anti-apoptotic activity of autocrine interleukin-22 and therapeutic effects of interleukin-22-small interfering RNA on human lung cancer xenografts[J]. Clin Cancer Res, 2008, 14: 6432-6439.
- [13] Livak K J, Schmittgen T D. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the $2^{-\Delta\Delta C_T}$ method[J]. Methods, 2001, 25: 402-408.
- [14] Adams J M. Ways of dying: multiple pathways to apoptosis[J]. Gene Dev, 2003, 17: 2481-2495.
- [15] Pickert G, Neufert C, Leppkes M, Zheng Y, Wittkopf N, Warn-tjen M, et al. STAT3 links IL-22 signaling in intestinal epithelial cells to mucosal wound healing[J]. J Exp Med, 2009, 206: 1465-1472.
- [16] Bhattacharya S, Ray R M, Johnson L R. STAT3-mediated transcription of Bcl-2, Mcl-1 and c-IAP2 prevents apoptosis in polyamine-depleted cells[J]. Biochem J, 2005, 392(Pt 2): 335-344.

[本文编辑] 尹 茶